1r N°. 3. Observations sur quelques hidrocelles — Malaval

un hôme a qui on avoit fait la ponction a l'ocasion d'un hidrocelle. fut attaqué deux Jours aprés d'une tension et inflamation, du scrotum ; la fiévre s'aluma, et devint violente, et compliquée de difficulté de respirer, grande soif, et insomnie.

madame son epouse allarmée de ces accidents, me pria d'avoir soin du malade : Je le saignai sur le champ, et reitterai ce remede, six fois en trois Jours les accidents persistant avec violence. le regime fut exactemt observé, ne donnant pour nourriture que du bouillon leger, et abondament de la tisane pour boisson. on lui donnoit deux lavements rafraischissans par Jour, et une prise d'apozeme de 4 en 4 heures dans l'intervalle des bouillons.

Le 4e. Jour la fiévre diminua, de meme que l'inflaon du scrotum et sa tension, ce qui me permit de reconnoitre, un epanchemt nouveau qui s'étoit fait dans les membrânes propres du testicule. J'y donnai un coup de trocart, et par cette ponction Je tirai un demi septier d'une eau un peu trouble, mais nullement sanglante ni purulente. cette evacuaon me donna lieu de sentir, qu'il y avoit au corps

ARC 15 d. 90
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Même du testicule, une tumeur particuliere
ou Je crus sentir quelque fluctuation. J'apliquai
un Cataplasme emollient sur cette partie. le
scrotum s'enflama de nouveau la tumeur augmenta
et il parut quelques Jours après un abcés considerable
entre la 2e membrane ~~interne~~ du testicule et ~~son corps~~ la troisieme
que J'ouvris, et étendis l'incision en haut et en bas
autant que la poche de l'abcés l'exigeoit, le testicule
resta entier et recouvert de la membrane albugineuse
Cette playe, qui s'etendoit depuis le bas du scrotum
Jusque dans l'aisne, fut pansée avec le digestif ordre
dans les pers Jours, puis avec l'onguent brun, a cause
que les chairs, trop promptem regenerées, estoient
un peu molasses. Le malade fut entierement guery
dans l'espasce d'un mois de cet abcés, et le fut
radicalement de l'hidrocelle.

Cette maladie m'a parû digne d'être raportée a raiso
de la prompte formation du second hidrocelle, et de
sa situation qui estoit sans doute dans la tunique
vaginale, bien distinguée de l'abcés qui estoit
logé entre cette membrane et l'albugineuse, ayant
observé avec attention l'epanchement purulent
qui estoit resté autour du testicule après avoir

fait la ponction, ainsi que Je lay fait observer ;
a legard de la guerison radicale qui s'est ensuivie
de l'hidrocelle, cela ne m'a point surpris, elle devoit
estre attendu la supuraon des membranes, et des
adherances qui ~~les faisoient~~ en sont les suittes ordinaires
et qui même se forment aprés l'inflamaon qui survient
a ces membranes, quoi que sans supuraon aparente
ainsi qu'on va le voir par l'observaon suivante

2e. observaon

un hoe. agé d'environ 60 ans, portoit depuis longtemps
un hidrocelle, auquel Je fis la ponction et tiray plus
d'un demi septier d'eau bien conditionnée, et dont le
malade fut soulagé, sans qu'il lui restat aucune
douleur ni incommodité ; la maladie ayant recidivé
quelques mois aprés (comme il est ordre.) Je lui fis encor
la même operaon, puis une troisiéme avec le même
succés, enfin l'ayant faicte une 4e fois, il sortit
au lieu d'eau, comme aux 3 pres., une liqueur presque
noire, et ressemblante a l'eau qu'on a gardé avec
le sang qu'on a tiré par la saignée du pied

12 14

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Le malade parût fort allarmé de ce changement croyant que j'avois picqué quelque vaisseau, et prenan toutte la liqueur que je tirai, pour du sang. Je l'assura qu'il n'avoit rien a craindre de cet accident, et lui fis même esperer que la guerison radicale de son hidrocelle pourroit en estre la suitte heureuse, ce qui en effet arriva, l'hidrocelle n'estant plus revenu Cette guerison me rapelle une consultation que j'ay faitte autrefois avec feu Mr Morand le pere.. ou le malade nous comuniqua par écrit l'avis de Mr Bussiere celebre chirurgien françois etabli a londres.. Ce chirurgien proposoit pour guerir radicale un hidrocelle, auquel j'avois fait la ponction plusieurs fois, de laisser la canulle dans la partie, apres avoir evacué les eaux, jusque a ce qu'il survint une inflamation a la partie, laquelle estant suivie d'une legere suppuration, causeroit une adherence des membranes, d'ou s'ensuivroit la guerison de l'hidrocelle quoi que Mr bussiere assurât, avoir eu plusieurs reussites de cette pratique, nous n'ozames hazarder de la tenter.. Crainte d'accidents dont le malade demandoit la guarentie, je dois adjouter que led. Sr bussiere proposoit encore d'injecter une dissolution d'alum dans la poche de l'hidrocelle, pour accellerer l'inflamaon

3ee observation

vn viellard de 74 ans portoit depuis longtems dans le scrotum, vne tumeur longue dénviron 9 ou 10 pouces et dela grosseur et figure dún cervelat.

La figure singuliere de cette tumeur, m'y fit faire beaucoup d'attention. je sentois quelque fluide, mais l'epaisseur des teguments m'empechoit d'apercevoir les eaux. parles questions que Je fis au malade Je scus qu'il avoit vne hernie intestinalle du même Côté. Je fis coucher le malade et reduisis l'intestin J'apliquay ensuite le bandage pour le contenir et aprés Je plongeay le troiscart lateralement dans le milieu dela tumeur, il en sortit vn demi septier d'eau. je vis allors que le bas dela tumeur estoit le testicule, et que les eaux se soutenoient par dessus, sans avoir (nonobstant la longueur du tems) rompu les adherances des tuniques propres; et c'est cette adherance qui faisoit que la poche de l'hydrocelle gardoit la figure cilindrique aulieu d'estre ronde comme ellest ordinairement. J'ay fait depuis plusieurs fois la même operation a ce malade avec les mêmes precautions et

Croyant que j'avois piqué quelque vaiss

Le Malade en fut fort alarmé. je l'assuray que la ponction n'étoit pas la cause de ce changement de la liqueur mais qu'elle dependoit plutost de la rupture de quelque petit vaisseau devenu variqueux et que ce n'estoit pas le panché, et que cet accident nouvellement seroit peut estre avantageux a sa maladie. en effet il ne s'est plus formé d'hydrocelle. Mais le testicule, ~~et~~ du même coté que j'avois remarqué des la 1.re ponction estre plus gros d'un tiers que celui du côté sain, de même que le cordon des vaisseaux spermatiques, sont restés dans le même estat

Cette observation me rapelle ~~le souvenir~~ d'une consultation que j'ay faites autrefois avec feu mons.r Morand, sur la proposition que M.r Bussieres celebre chirurgien francois établi a londres, fit a feu M.r de pleneuf, pour le guerir radicalem.t d'une hydrocelle, pour laquelle je lui avois fait plusieurs fois la ponction. C'estoit de laisser la Canulle, aprés avoir fait la ponction, jusque a ce qu'il se fit inflamation a la partie, qui estant suivie d'une legere supuration, causoit adherance aux membranes du sac de l'hydrocelle, et la maladie estoit guerie. quoy que M.r Bussiere assurât avoir eu plusieurs reussites de cette pratique, nous n'ozâmes hazarder de la tenter, crainte d'accidents qui peuvent survenir auxquels nous ne crûmes pas devoir exposer a M.r

le meme Succés, et Jay toujour observé que
les eaux avoient gardé la meme Situation
Sans dessendre dans les membranes qui entourent
immediatement le testicules et Sétant contenuis
dans la guaisne des vaisseaux Spermatiques

4e. observation

un homme denviron 40 ans, Se disant medecin
portoit depuis dix ans dans le Scrotum, une
tumeur dont il ne connoissoit pas le caractere
Cestoit une hydrocelle dont la volume Surpassoit
Celui dun gros balon, mestant bien assuré
quil ny avoit point de parties du ventre dans
cette tumeur Jy donnai un coup de troicart, et
tiray par cette ponction trois pintes et demie
d'une eau tres limpide.
Je raporte cette observation a cause de la grosseur
énorme de la tumeur, et de la bonne qualité
des eaux qui y croupissoient depuis dix ans
sans avoir Souffert la moindre alteration

Malaval

[stamp] ... DE MEDECINE